

DOSIS DE ACETAMINOFÉN (POR EJEMPLO, TYLENOL®)

NO se recomienda para bebés menores de 2 meses de edad. Dar medicamento cada 4-6 horas para aliviar síntomas de fiebre o dolor. **NOTA:** En algunas concentraciones (mg/ml) de acetaminofén las fases se separan. Asegúrese de verificar la concentración en el frasco de acetaminofén antes de administrarla.

Peso (libras)	Peso (kilos)	Jarabe líquido para niños (160mg/5mL)	Tabletas masticables (tableta de 80mg)
12-17 libras	5.5-7.9 kilos	2.5 mL	---
18-23 libras	8-10.9 kilos	3.7 mL	---
24-35 libras	11-15.9 kilos	5 mL	2 tabletas (160 mg)
36-47 libras	16-20.9 kilos	7.5 mL	3 tabletas (240 mg)
48-59 libras	21-26.5 kilos	10 mL	4 tabletas (320 mg)
60-71 libras	26.6-32.2 kilos	12.5 mL	5 tabletas (400 mg)

DOSIS DE IBUPROFENO (POR EJEMPLO, MOTRIN® Y ADVIL®)

Para niños mayores de 6 meses. Dar medicamento cada 6-8 horas para aliviar síntomas de fiebre o dolor.

Peso (libras)	Peso (kilos)	Jarabe líquido para niños (100mg/5 mL)	Tabletas para niños (100mg)	Pastillas para adultos (200mg)
12-21 libras	5.5-7.9 kilos	2.5 mL	---	---
22-33 libras	8-14.9 kilos	5 mL	1 tableta (100mg)	---
34-43 libras	15-19.9 kilos	7.5 mL	1 tableta (100mg)	---
44-55 libras	20-24.9 kilos	10 mL	2 tableta (200 mg)	1 pastilla (200 mg)
56-66 libras	25-29.9 kilos	12.5 mL	2 tableta (200 mg)	1 pastilla (200 mg)
67-88 libras	30-39.9 kilos	15 mL	3 tableta (300mg)	---
89+ libras	40+ kilos	---	4 tableta (400 mg)	2pastilla (400 mg)